

外科檢體之送檢 SOP

1. 檢體定義：
 - (1) 由外科手術切除之組織檢體。
 - (2) 生檢採樣的組織：包含針芯生檢（needle core biopsy）、穿刺生檢（punch biopsy）和楔形生檢（wedge biopsy）。
 - (3) 內視鏡方式取得之組織。
2. 檢體的固定與包裝：
 - (1) 固定：10%的中性福馬林緩衝液。
 - (2) 組織與福馬林的體積比例為 1：10。
 - (3) 大型檢體：需沿著長軸製造一條垂直於長軸的切口，但不將組織切斷或十字切開。
 - (4) 小型檢體（如：needle core biopsy）：直接將檢體放入小容量福馬林瓶中。勿使用拭鏡紙或紗布等包覆。
 - (5) 容器：建議塑膠廣口瓶。
 - (6) 請用膠帶封口，避免福馬林於運送時漏出。
3. 外科病理送檢單的填寫重點：
 - (1) 送檢單填寫完請防水包裝，避免福馬林漏出毀損文件。
 - (2) 外科病理送檢單必須與檢體一同送出，並建議同時 E-mail 電子檔至 vetcopath@vetcogroup.com。
4. 檢體寄送方式：
 - (1) 各種寄件通路，如：宅急便、郵局、宅配通等。
 - (2) 直接送至臺灣動藥病理診斷中心（新北市新莊區五權一路 5 號 2 樓 219 室，電話 02-2299-5767）。
5. 病理報告收發：
 - (1) 一般檢體：於收件日期隔日會以醫院勾選之方式（電話、電子郵件、Line）通知初步診斷，並於 2～3 個工作日內寄出正式最終報告。
 - (2) 若初步診斷為惡性腫瘤，採雙病理獸醫師確認制。
 - (3) 若組織未固定完全、需要脫鈣、需特殊染色或免疫組織化學（IHC）染色，則須再加 1～2 個工作天。
 - (4) 若未收到檢驗結果，請聯絡江家瑋 病理獸醫師（02）2299-5767。